

Bakterie- og virusinfeksjon (forts.)

Ved halsbetennelse med streptokokker kan barnet komme tilbake til barnehagen når det har vært på full pencilindose i minst ett døgn. I tillegg må barnet være i god form og feberfri.

Hodelus

Barnet kan komme tilbake til barnehagen så snart behandlingen er igangsatt. Andre barn, familie og ansatte bør behandles kun når det er påvist lus. Dersom barnet har hodelus, bør man gi beskjed til ansatte slik at forebyggende tiltak opp mot andre barn kan iverksettes.

Meslinger, kuma og røde hunder

Meslinger, kuma og røde hunder er sykdommer som vi heldigvis stort sett er godt beskyttet mot i Norge pga at de aller fleste barn har fulgt barnevaksinasjonprogrammet. Det er likevel noen som velger å ikke vaksinere sine barn og noen barn som ikke kan få vaksine. Dersom disse sykdommene skulle oppstå bør

dette håndteres av lege. Skulle barnehagen få beskjed om at et barn har fått en av disse sykdommene, bør de kontakte smittevernkontoret i kommunen for hjelp til videre smitteverntiltak i barnehagen.

Vannkopper (Vericella)

Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettene har tørket inn.


Mark (barnemark)/Spolmark/Ringorm

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn.

Skabb

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

Brann **Politi** **Ambulanse**
110 **112** **113**



www.drammen.kommune.no

Layout: Grafisk senter Drammen kommune 2012



DRAMMEN
KOMMUNE



Når skal barn holdes hjemme fra barnehagen?



Drammen kommunale barnehager

NÅR SKAL BARN HOLDES HJEMME FRA BARNEHAGEN?

Det er ofte en vanskelig avgjørelse å ta når de små ikke virker helt i form.

Er barnet bare litt forkjølet eller trøtt, men kvikner til så snart det kommer i barnehagen? Eller bør barnet være hjemme? I utgangspunkt er det barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldrenes skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å delta i barnehagens aktiviteter.

Denne brosjyren er laget av Drammen kommunale barnehager og er godkjent for bruk i alle de kommunale barnehagene i Drammen. Innholdet er i hovedsak hentet fra Folkehelseinstituttets anbefalinger fra januar 09.

Brosjyren har vært vurdert av Smittevernkontoret i Drammen kommune. Vi håper alle vil ta mest mulig hensyn til anbefalingene slik at barna i størst mulig grad unngår unødig smitte for seg selv og andre.

Barnehagen vektlegger også gode hygienerutiner for å forbygge spredning av smittsomme sykdommer.

Her er oversikt over de hyppigste symptomene og sykdommene, med anbefalinger i forhold til når barnet bør være hjemme.

Feber

Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 ° om morgenen og 38 ° på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

Diarè med eller uten oppkast

Så lenge barnet har diarè eller kaster opp, må det holdes hjemme. Hold barnet hjemme i 48 timer etter at de er blitt sytomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Med diarè menes 3 eller flere løse til vandig avføringer om dagen. At et barn har kastet opp en gang, skreket eller hostet til det har brukket seg medfører ikke at barnet behøver å være hjemme i 2 døgn. En gastroenteritt/ omgangssyke er gjerne ikke over etter en hendelse, da er det som regel en annen årsak til at barnet har kastet opp. Barn som til vanlig har løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen.

Ved diarétilstander hvor man mistenker bakterier overført fra mat (for eksempel

etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege. Hvis barnet får blodig diaré skal lege kontaktes umiddelbart.

Barn som får diarè eller oppkast i barnehagen, bør skjermes sammen med en ansatt inntil de blir hentet.

Øyekatarr

Det er ikke nødvendig av smittevernhensyn å holde barn hjemme ved mild til moderat øyekatarr. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.

Dersom lege setter i gang behandling kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Ved tvil kan barnehagen drøfte dette med barnets foresatte. Ved usikkerhet bør lege kontaktes.

Forkjølelse

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved hoste uten feber kan barnet gå i barnehagen. Ved langvarig og kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.

Influenza

Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Kikhoste

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir barnet vanligvis smittefri 5 dager etter igangsatt behandling, og barnet bør holdes hjemme i denne perioden. Ved behandling senere i forløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barnet kan derfor gå i barnehagen dagen etter at behandlingen er startet. Friske søsken som får forebyggende behandling kan være i barnehagen.

Ørebetennelse

Ørebetennelse arter seg vanligvis om plutselig øreverv ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Brennkopper

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når brennkoppene er tørre og i god tilheling. Når man vurderer om barnet skal tilbake til barnhagen igjen, må det ikke lenger være fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små brennkopper kan barnet gå i barnehagen dersom disse kan dekkes godt til.

Bakterie- og virusinfeksjon

Ved infeksjoner som skyldes en bestemt bakterie eller virus, er det legen som skal bestemme når barnet kan komme tilbake til barnehagen. For de fleste sykdommene som er nevnt i folkehelseinstituttets anbefalinger mener de at barnet kan komme tilbake 2 døgn etter symptomfrihet.